

Ibuprofeno 400 mg Homatropina 4 mg

Ibuprofen®

IBUFEM®
IBUPROFENO – HOMATROPINA METILBROMURO
Comprimidos
VENTA LIBRE . INDUSTRIA ARGENTINA

- **Composición:** Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 400 mg, Homatropina Metilbromuro 4 mg. Excipientes autorizados: croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, lactosa monohidrato, c.s.
- **Acción Terapéutica:** Analgésico. Antiinflamatorio. Antiespasmódico. El Ibuprofeno tiene acción analgésica y antiinflamatoria, mientras que la Homatropina presenta acción antiespasmódica, relajando la musculatura del aparato digestivo, vías biliares y órganos genitourinarios. La combinación del efecto antiespasmódico y analgésico le confieren características adecuadas para el tratamiento de los cuadros de los espasmos dolorosos de la zona abdominal.
- **Indicaciones:** Indicado para el alivio temporal del dolor menstrual (Dismenorrea), así como también para el tratamiento de espasmos dolorosos que afecten los aparatos genitourinario, gastrointestinal, y la vía biliar.
- **Posología:**
Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 8 horas mientras los síntomas persistan. La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos diarios.
Mayores de 65 años: consulte a su médico.
Niños menores de 15 años: consulte a su médico.
Este medicamento no debe ser usado por un periodo mayor a 5 días para el alivio del dolor. En el caso de presentarse malestar y/o dolor estomacal al ingerir los comprimidos, acompañar la ingesta con alimentos o con leche. Si el malestar y/o dolor estomacal persisten o empeoran al cabo de 48 horas, consulte a su médico.
- **Contraindicaciones:**
 - Este medicamento no debe ser utilizado por pacientes que presenten alergia al Ibuprofeno, a la aspirina, a la homatropina o butilbromuro de Hioscina (escopolamina), o alergia a otros analgésicos antiinflamatorios, o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
 - No utilizar este medicamento si se tienen antecedentes de úlceras pépticas o hemorragias digestivas.
 - Este medicamento esta contraindicado en aquellos pacientes que presenten glaucoma de ángulo estrecho (aumento de la presión en los ojos), estenosis pilórica, obstrucción intestinal, ileo paralítico, colitis ulcerosa, hipertrofia prostática (disminución del flujo de salida de la orina), miastenia gravis e insuficiencia hepática o renal.
- **Advertencias y Precauciones:**
 - Los pacientes con alteraciones en la coagulación o bajo

tratamiento con anticoagulantes orales o Heparina, o aquellos que padezcan asma o hipertiroidismo deben consultar a su médico antes de utilizar este medicamento, así como también deben hacerlo los pacientes que estén recibiendo litio, diuréticos, otros analgésicos antiinflamatorios (paracetamol, aspirina), metotrexato, sales de oro u otro producto que contenga Ibuprofeno.

- Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse conjuntamente medicamentos que los posean, excepto bajo supervisión médica.
- Pacientes con hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o con antecedentes de ulcera gástrica o duodenal deben consultar a su médico antes de consumir este medicamento.
- Los pacientes que beban más de tres vasos de bebidas alcohólicas deben consultar a su médico previamente a su utilización.
- Los ancianos suelen presentar mayor susceptibilidad a los efectos de la Homatropina.
- La ingesta de ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Si los síntomas continúan, deberá consultar a su médico.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor.

- **Efectos Colaterales:** Ocasionalmente puede producir alteraciones gastrointestinales (náuseas), mareos, cefaleas (dolor de cabeza), erupciones en la piel y picazón. En raras ocasiones pueden producirse alteraciones a nivel sanguíneo, reacciones alérgicas, y broncoespasmos en pacientes con antecedentes de asma provocada por la ingesta de aspirinas.
Por contener Homatropina también se puede observar sequedad de boca, disminución de la motilidad gastrointestinal y constipación, dificultad para orinar, sequedad de piel y rubor (enrojecimiento facial), dilatación de pupilas, fotofobia (molestias al observar la luz), edema y retención de líquido (que desaparece al discontinuar el uso del medicamento), palpitaciones, taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca) y arritmias (alteración del ritmo cardíaco). En raras ocasiones produce un aumento de la presión arterial.
- **Sobredosificación:** Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Htal. de Pediatría "Dr. Ricardo Gutierrez": (011) 4962-6666/2247
Htal. "A. Posadas": (011) 4654-6648/ 4858/ 7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

Presentaciones: Envase conteniendo 6, 8, 10, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 50, 80, 480*, 500*, 800* y 1000*. * Presentaciones de uso hospitalario.

Conservación: IBUFEM Comprimidos debe ser conservado en un lugar seco, a temperatura menor a 25° C, en su estuche original.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO.**

Biotenk®

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 53.924

Dirección Técnica: Silvia G. Balanian - Farmacéutica
BIOTENK S.A. Zuviria 5747, Capital Federal
Fecha de última revisión: junio de 2011