

# Ibutenk<sup>VL</sup>®

Ibuprofeno 400 mg

## Ibutenk VL<sup>®</sup> Ibuprofeno 400 mg

VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA

### Fórmulas

**IBUTENK VL 400 mg.** Cada comprimido contiene: Ibuprofeno precompactado 400 mg, excipientes autorizados: celulosa microcristalina PH 102, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, lactosa monohidrato granulada, c.s.

### Acción Terapéutica

Analgésico. Antifebril. Antiinflamatorio.

### Indicaciones

**Ibutenk VL Comprimidos 400 mg:** indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes) dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

### Posología / Modo de Administración

Ibutenk VL 400 mg comprimidos:

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

### Contraindicaciones

No utilizar si es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

### Advertencias y Precauciones

#### Ibutenk VL comprimidos.

- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. -Si el dolor o la fiebre persisten o se agravan, si presentan nuevos síntomas, o el área dolorida está roja o hinchada, consultar a su médico.

- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

- Aunque el IBUPROFENO tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no debe administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

- La ingesta del Ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

- Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

- No tome este producto si tiene úlcera péptica activa, asma, rinitis, urticaria asociada con aspirina u otro antiinflamatorio no esteroide.

- Puede aumentar los efectos de los anticoagulantes orales y reducir la acción de los diuréticos y drogas antihipertensivas.

**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

**Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.**

### Reacciones Adversas

**Ibutenk VL comprimidos:** Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

### Interacciones con otros Medicamentos

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

### Sobredosificación

Ante la eventualidad de una sobre dosificación,

concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/658-7777

-Hospital de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115

- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

### Conservación

Conservar a temperatura ambiente (preferentemente entre 15 y 30°C). **Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

### Presentaciones

**Ibutenk VL 400 mg comprimidos:** envases conteniendo 10, 20, 40, 60, 250\* y 500\* comprimidos.

\* Envases USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO conteniendo 250 y 500 comprimidos.

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.**



Especialidad Medicinal Autorizada  
por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 42.597  
Biotenk S.A. Zuviniá 5747, Capital Federal.  
Dirección Técnica: Silvia G. Balanian, Farmacéutica.

Fecha de última revisión: Julio de 2008.