

Informe a su médico o farmacéutico si usted está embarazada, ha tomado en los últimos 7 días o le han recetado ácido fusídico.

Los efectos de estos medicamentos pueden verse modificados por **ROSTAN** o pueden cambiar el efecto de **ROSTAN**.

Toma de ROSTAN con alimentos y bebidas

Puede tomar **ROSTAN** con o sin alimentos.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. No tome **ROSTAN** si está embarazada o en período de lactancia. Si se queda embarazada mientras está tomando **ROSTAN** deje de tomarlo inmediatamente e informe a su médico. Las mujeres deben evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento con **ROSTAN** empleando un método anticonceptivo apropiado.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas

La mayoría de los pacientes pueden conducir vehículos y utilizar máquinas durante el tratamiento con **ROSTAN** ya que no afectará a su capacidad. Sin embargo, algunos personas pueden sentir mareos durante el tratamiento con **ROSTAN**. Si se encuentra mareado consulte a su médico antes de intentar conducir o usar máquinas.

ROSTAN contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar ROSTAN

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

La dosis normal es una vez al día, tomada con o sin alimentos. Trague la dosis recomendada con un poco de agua.

Deje de tomar ROSTAN y busque atención médica inmediatamente si presenta alguna de las siguientes reacciones alérgicas:

- Dificultad para respirar, con o sin hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta.
- Hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, que puede provocar dificultad para tragar. Pícor intenso de la piel (con ronchas).
- Síntomas musculares son más frecuentes en niños y adolescentes que en adultos. Como con otras estatinas, un número muy reducido de personas ha sufrido efectos musculares desagradables que, muy raramente, han resultado en una lesión muscular potencialmente mortal llamada rabdomiolisis.

Recuentos: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas

Deje de tomar ROSTAN y consulte a su médico inmediatamente si presenta dolores y calambres musculares injustificados que duran más de lo esperado. Los síntomas musculares son más frecuentes en niños y adolescentes que en adultos. Como con otras estatinas, un número muy reducido de personas ha sufrido efectos musculares desagradables que, muy raramente, han resultado en una lesión muscular potencialmente mortal llamada rabdomiolisis.

Recuentos: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas

- Dolor de cabeza.
- Mareo.
- Estreñimiento.

- Síntome problemas renales moderados.
- Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de ROSTAN para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Dosis habituales en niños de 10-17 años de edad

La dosis habitual recomendada para iniciar el tratamiento es de 5 mg. Su médico podrá aumentar la dosis hasta alcanzar aquella dosis de **ROSTAN** que sea adecuada para usted. La dosis máxima diaria recomendada es de 20 mg. Tome la dosis indicada por su médico una vez al día. No deben administrarse los comprimidos de **ROSTAN** 40 mg a niños.

Toma de los comprimidos Trague cada comprimido entero con agua.

Tome ROSTAN una vez al día. Puede tomarlo a cualquier hora del día. Intente tomar los comprimidos a la misma hora cada día. Esto le ayudará a recordarle que debe tomárselos.

Controles regulares de los niveles de colesterol

Es importante que acuda a su médico regularmente para realizarse controles del colesterol, con

objetos de comprobar que sus niveles de colesterol se han normalizado y se mantienen en niveles apropiados.

Su médico puede decidir aumentar su dosis para que esté tomando la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted.

Si toma más ROSTAN de la que debe

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Centros de Toxicología:

- **Centro de Intoxicaciones del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"**: Teléfonos: (011) 4962- 6666 6 4962- 2247
- **Centro de Intoxicaciones del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde"**: Teléfonos: (011) 4300- 2115 6 4362- 6663
- **Hospital Nacional "Profesor A. Posadas"**: Teléfonos: (011) 4654-6648 6 4658- 7777
- **Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"**: Teléfonos: (0221) 454-5555

Si olvidó tomar ROSTAN

Si olvidó tomar un comprimido, no se preocupe, pero tómelo tan pronto como sea posible. Sin embargo, si es el momento de tomar la siguiente dosis, salte la dosis olvidada y continúe tomando su dosis habitual cuando lo toque. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con ROSTAN

Esta decisión sólo puede ser tomada con el consentimiento de su médico ya que sus niveles de colesterol pueden volver a aumentar una vez que deje de tomar rosuvastatina.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **ROSTAN** puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Deje de tomar ROSTAN y busque atención médica inmediatamente si presenta alguna de las siguientes reacciones alérgicas:

- Dificultad para respirar, con o sin hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta.
- Hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, que puede provocar dificultad para tragar. Pícor intenso de la piel (con ronchas).
- Síntomas musculares son más frecuentes en niños y adolescentes que en adultos. Como con otras estatinas, un número muy reducido de personas ha sufrido efectos musculares desagradables que, muy raramente, han resultado en una lesión muscular potencialmente mortal llamada rabdomiolisis.

Recuentos: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas

Deje de tomar ROSTAN y consulte a su médico inmediatamente si presenta dolores y calambres musculares injustificados que duran más de lo esperado. Los síntomas musculares son más frecuentes en niños y adolescentes que en adultos. Como con otras estatinas, un número muy reducido de personas ha sufrido efectos musculares desagradables que, muy raramente, han resultado en una lesión muscular potencialmente mortal llamada rabdomiolisis.

Recuentos: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas

- Dolor de cabeza.
- Mareo.
- Estreñimiento.

- Síntome problemas renales moderados.
- Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Aumento de la dosis y dosis máxima diaria

Su médico puede decidir aumentarle la dosis. Esto es para que tome la dosis de **ROSTAN** adecuada para usted. Si empezó con una dosis de 5 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 10 mg, luego a 20 mg y más tarde a 40 mg, si fuera necesario. Si empezó con una dosis de 10 mg, su médico puede decidir doblar la dosis a 20 mg y luego a 40 mg, si fuera necesario. Habrá un intervalo de cuatro semanas entre cada ajuste de dosis. La dosis máxima diaria de **ROSTAN** es de 40 mg. Esta dosis es solamente para pacientes con niveles altos de colesterol y con un riesgo alto de sufrir un ataque al corazón o infarto cerebral, cuyos niveles de colesterol no disminuyen lo suficiente con 20 mg.

Verifique con su médico o farmacéutico cuál es la mejor dosis de inicio de **ROSTAN** para usted. Su médico puede decidir iniciar el tratamiento con la dosis más pequeña (5 mg):

- **Si es de origen asiático** (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio).
- **Si es mayor de 70 años**, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de **ROSTAN** adecuada para usted.

- **Si tiene problemas renales moderados.**
- **Si tiene riesgo de padecer dolores y calambres musculares (miopatía).**

Rostan® Rosuvastatina

Comprimidos recubiertos

Venta bajo receta	Industria Argentina
Fórmula cuantificativa	
Cada comprimido recubierto de 5 mg contiene: Rosuvastatina cálcica - 5,21 mg. Excipientes: Lactosa monohidrato D, Crossameloosa Sódica, Fosfato Tricalcico, Lauril Sulfato de Sodio, Celulosa microcristalina PH 102, Estearato de Magnesio. Cobertura: Hidroxipropilmetilcelulosa, Polietilenglicol 6.000, Aceite de Castor, Talco, Dióxido de titanio, c.s. Cada comprimido recubierto de 10 mg contiene: Rosuvastatina - como Rosuvastatina cálcica - 10,42 mg. Excipientes: Lactosa monohidrato D, Crossameloosa Sódica, Fosfato Tricalcico, Lauril Sulfato de Sodio, Celulosa microcristalina PH 102, Estearato de Magnesio. Cobertura: Hidroxipropilmetilcelulosa, Polietilenglicol 6.000, Aceite de castor, Talco, Dióxido de titanio, c.s. Cada comprimido recubierto de 20 mg contiene: Rosuvastatina - como Rosuvastatina cálcica - 20,84 mg. Excipientes: Lactosa monohidrato D, Crossameloosa Sódica, Fosfato Tricalcico, Lauril Sulfato de Sodio, Celulosa microcristalina PH 102, Estearato de Magnesio. Cobertura: Hidroxipropilmetilcelulosa, Polietilenglicol 6.000, Aceite de castor, Talco, Dióxido de titanio, c.s.	

Indicaciones
La rosuvastatina debe ser usado como un complemento de la dieta, cuando la respuesta a la dieta y el ejercicio no es suficiente.

Prevención de eventos cardiovasculares: está indicado en pacientes adultos con un incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica basado en la presencia de marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tales como nivel elevado de PCrAs, edad, hipertensión arterial, nivel bajo de C-HDL, tabaquismo o antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Para reducir la morbatiad total y el riesgo de eventos cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, accidente vascular cerebral, infarto al miocardio, angina inestable o revascularización arterial). En pacientes adultos con hipercolesterolemia: reduce el colesterol LDL (C-LDL), colesterol total y triglicéridos elevados e incrementa el Colesterol HDL (C-HDL), en pacientes con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigótica y no familiar) y displipemia mixta (incluyendo Fredrickson Tipo IIa y IIb). Disminuye también: ApoB, Colesterol no HDL, Colesterol-VLDL, VLDL-TG, así como los índices C-LDL/C-HDL, Colesterol total/C-HDL, C-noHDL/C-HDL, ApoA/Apo-L, e incrementa la ApoA-C y los lípidos C-total /HDL-C, no HDL-C/HDL-C y ApoB/Apo-L. Rosuvastatina se absorbe por vía digestiva y presenta una biodisponibilidad del 20% debido al efecto de primer paso en el hígado, sito principal de la síntesis del colesterol y de depuración de LDL. C. Alcanza su máxima concentración plasmática luego de las 5 h de su administración y se acumula mínimamente con la administración repetida. Rosuvastatina se acumula aproximadamente 90% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. El compuesto sin modificaciones representa más del 90% de la actividad inhibidora de la HMG CoA reductasa circulante. Sufre un metabolismo limitado (aproximadamente 10%), transformándose principalmente en la forma N-desmetilada. Su eliminación sin modificar se realiza en un 90% por heces y el resto es excretado en la orina. Se administra oralmente en su forma activa con niveles plasmáticos máximos observados a las 5 horas

Farmacodinamia: Pertenece a la familia de las estatinas (lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatina, etc.) y como ellas actúa como un inhibidor competitivo y selectivo de la enzima HMG-CoA reductasa que cataliza la conversión de la coenzima A 3-hidroxi-3-metilglutaril en mevalonato, un precursor del colesterol. Los triglicéridos (TG) y el colesterol en el hígado se incorporan a la apolipoproteína B (ApoB) para formar la lipoproteína de muy baja densidad (VLDL), la cual se libera al torrente sanguíneo y se distribuye a los tejidos periféricos. A su vez,