

# ZOLTENK® OMEPRAZOL 20 MG

Cápsulas conteniendo pellets gastrorresistentes

Venta Libre

Industria Argentina

Información para el paciente

Vía de administración: vía oral

## LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO,

Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

### ¿QUÉ CONTIENE?

Cada cápsula con pellets gastrorresistentes contiene: OMEPRAZOL 20 mg. Excipientes: manitol, fosfato dihidrogenado, laurilsulfato sódico, ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa, triacetin, sacarosa, lactosa, almidón, polivinilpirrolidona (K-30), alcohol cetílico, carbonato de magnesio.

### ACCIÓN:

Zoltenk (Omeprazol 20 mg) reduce la producción de ácido estomacal.

### ¿PARA QUÉ SE USA ZOLTENK (Omeprazol 20 mg)?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ZOLTENK (Omeprazol 20 mg)?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.

No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- tiene dificultad o dolor al tragar la comida;
- tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones;
- tiene diarrea prolongada o que no mejora;
- tiene acidez desde hace más de tres meses;
- tiene acidez con mareos o transpiración;
- tiene dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello;
- tiene dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- tiene pérdida de peso inexplicable;

-tiene dolor de estómago, náuseas o vómitos;

-tiene trastornos renales y/o hepático.

**Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.**

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.

Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante);
- Digoxina (medicamento para el corazón);
- Teofilina (medicamento broncodilatador);
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores);
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamentos para la infección VIH- SIDA);
- Fenitoina (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Omeprazol.

### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

**Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.**

Tome una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.

No rompa ni mastique las cápsulas.

No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.

**No tome por más de 14 días sin consulta médica.**

**Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.**

No se debe tomar Zoltenk (Omeprazol) como medicación preventiva.

**El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.**

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777  
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767  
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

### **¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?**

Comuníquese a los siguientes teléfonos: ANMAT Responde: 0800 333 1234

### **CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**

Mantener las cápsulas entre 15 y 30°C, proteger de la luz y la humedad.  
Las cápsulas son afectadas por la humedad, por lo tanto deben ser mantenidas en el envoltorio original.

### **PRESENTACIONES**

**Zoltenk 20 mg: Envases conteniendo 15 cápsulas con pellets gastrorresistentes,**  
**Presentaciones en Dispenser: envases conteniendo 30 y 60 cápsulas con pellets gastrorresistentes,**  
**Presentaciones de uso hospitalario exclusivo : envases conteniendo 375 y 750 cápsulas con pellets gastrorresistentes.**

**Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños**

**Lea atentamente las indicaciones y ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.**



Esp. Med. Aut. por el M.S. Cert. N° 44.872

Biotenk S.A. Zuviría 5747, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elaborado en: Cañada de Gomez 4060/66/70/74/76,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirección Técnica: Silvia G. Balanian. Farmacéutica

Fecha de última revisión: 24/09/2025

DI-2025-7171-APN-ANMAT#MS

5331/0