



# Befol<sup>VL</sup>

Diclofenac Potásico 25 mg

**Befol VL<sup>®</sup>**  
**Diclofenac Potásico 25 mg**  
*Comprimidos recubiertos*  
VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA

**Fórmula**

Cada comprimido de Befol VL 25 mg contiene: Diclofenac potásico 25 mg, excipientes autorizados: lactosa monohidratada, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, croscarmelosa sódica, cubierta gastro soluble compuesta por: hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, aceite de castor, dióxido de titanio, alcohol etílico, agua purificada.

**Acción Terapéutica**

Analgésico. Antiinflamatorio.

**Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información.**

Está indicado para el alivio sintomático de dolores de espalda, musculares, dolores en las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

**Cómo usar este medicamento:**

**Adultos y mayores de 15 años:** 1 comprimido 3 veces por día (cada 8 horas). Dolores menstruales: 1 comprimido 1 ó 2 veces por día. Ingerir preferentemente el producto después de las comidas. Dosis máxima: 75 mg/día (3 comprimidos de 25 mg).

**Mayores de 65 años:** consulte con su médico.

**Niños menores de 15 años:** consulte con su médico.

- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal
- Transcurridos 3 días de uso sin mejoría de la sintomatología o con empeoramiento del padecimiento, se recomienda consultar con un médico.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.
- No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médica.

**Contraindicaciones**

- Alergia conocida a algunos de los componentes de la fórmula. Ante la duda, consulte al médico.
- Personas a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas serias.
- Úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias.
- Enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón.
- Hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante.
- Tratamiento intensivo o diurético.
- Insuficiencia hepática, renal.
- Embarazo o lactancia.
- Menores de 15 años.

**Advertencias y Precauciones**

- Si se presentaran síntomas de hipersensibilidad o alergia sin antecedentes conocidos, suspender la ingestión del producto.
- Si consume otro medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico.
- Antes de utilizar este producto conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.
- Si usted consume 3(tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados) obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

**Reacciones Adversas**

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ejemplo náuseas/ vómitos, diarrea/ constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.

Todos estos síntomas, como así también otros no especificados, pueden ser atribuidos o no al uso del producto; por lo tanto, si usted presenta alguno de los mismos u otro tipo de sintomatología que le despierte sospecha, le sugerimos acudir inmediatamente al médico.

**Sobredosis**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez** | Tel.: (011) 4962 6666/ 2247

**Hospital Dr. Alejandro Posadas** | Tel.: (011) 4654 6648/ 4658 7777

**Centro de Asistencia Toxicológica La Plata** | Tel.: (0221) 451 5555

**Presentación**

**Comprimidos recubiertos de 25 mg:** envases conteniendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100\*, 250\*, 500\* y 1000\* comprimidos recubiertos.

\* Uso Hospitalario Exclusivo.

**Conservación**

Conservar a temperatura ambiente (preferentemente entre 15 y 30°C), proteger de la luz.

**Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

**Ante la menor duda, consulte a su médico y/ o farmacéutico.**



Especialidad Medicinal Autorizada

por el Ministerio de Salud. Certificado N° 49.514

Biotenk S.A. Zuviría 5747, C.A.B.A.

Elaborado en: Cañada de Gómez 4060/66/70/74/76, C.A.B.A.

Dirección Técnica: Silvia G. Balanian, Farmacéutica.

Fecha de última revisión: Abril de 2022