

Befol^{VL}

Diclofenac Potásico 25 mg

Befol VL®
Diclofenac Potásico 25 mg
Comprimidos recubiertos
VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA

Fórmula

Cada comprimido de Befol VL 25 mg contiene: Diclofenac potásico 25 mg, excipientes autorizados: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, croscarmelosa sódica, cubierta gastro soluble compuesta por: hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, aceite de castor, talco, dióxido de titanio.

Acción Terapéutica

Analgésico. Antiinflamatorio.

Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información.

Está indicado para el alivio sintomático de dolores de espalda, musculares, dolores en las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

Cómo usar este medicamento:

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido 3 veces por día (cada 8 horas). Dolores menstruales: 1 comprimido 1 ó 2 veces por día. Ingerir preferentemente el producto después de las comidas. Dosis máxima: 75 mg/día (3 comprimidos de 25 mg).

Mayores de 65 años: consulte con su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal.
- Transcurridos 3 días de uso sin mejoría de la sintomatología o con empeoramiento del padecimiento, se recomienda consultar con un médico.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.
- No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médica.

Contraindicaciones

- Alergia conocida a algunos de los componentes de la fórmula. Ante la duda, consulte al médico.
- Personas a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas serias.
- Úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias.
- Enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón.
- Hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante.
- Tratamiento intensivo o diurético.
- Insuficiencia hepática, renal.
- Embarazo o lactancia.
- Menores de 15 años.

Advertencias y Precauciones

- Si se presentaran síntomas de hipersensibilidad o alergia sin antecedentes conocidos, suspender la ingestión del producto.
- Si consume otro medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico.
- Antes de utilizar este producto conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.
- Si usted consume 3(tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

Reacciones Adversas

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ejemplo náuseas/ vómitos, diarrea/ constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.

Todos estos síntomas, como así también otros no especificados, pueden ser atribuidos o no al uso del producto; por lo tanto, si usted presenta alguno de los mismos u otro tipo de sintomatología que le despierte sospecha, le sugerimos acudir inmediatamente al médico.

Sobredosis

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez | Tel.: (011) 4962 6666/ 2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas | Tel.: (011) 4654 6648/ 4658 7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata | Tel.: (0221) 451 5555

Presentación

Comprimidos recubiertos de 25 mg: envases conteniendo 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 90, 100, 500*, 1000* comprimidos recubiertos.

* Uso Hospitalario Exclusivo.

Conservación

Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C, proteger de la luz.

Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante la menor duda, consulte a su médico y/ o farmacéutico.

Biotenk®

Especialidad Medicinal Autorizada

por el Ministerio de Salud. Certificado N° 49.514

Biotenk S.A. Zuviría 5747, C.A.B.A.

Elaborado en: Cañada de Gómez 4060/66/70/74/76, C.A.B.A.

Dirección Técnica: Silvia G. Balanian, Farmacéutica.

Fecha de última revisión: Abril de 2022