

PULMONIX FORTE

BROMHEXINA

CLORHIDRATO 1.6 mg/ml

Jarabe
Administración vía oral

Venta Libre

Industria Argentina

Información para el paciente

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR A TOMAR ESTE MEDICAMENTO, PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 5 días.

Contenido del prospecto

1. Qué es PULMONIX FORTE y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar PULMONIX FORTE
3. Cómo tomar PULMONIX FORTE
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de PULMONIX FORTE
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es PULMONIX FORTE y para qué se utiliza.

El PULMONIX FORTE es un expectorante y mucolítico de las secreciones bronquiales indicado para el tratamiento sintomático del catarro bronquial., La bromhexina, principio activo de este medicamento, pertenece a los llamados mucolíticos que actúan disminuyendo la viscosidad de las secreciones mucosas, fluidificándolas y facilitando su eliminación. Este medicamento está indicado para reducir la viscosidad de mocos y flemas, facilitando su expulsión, en resfriados y gripes. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 5 días de tratamiento.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar PULMONIX FORTE.

Durante los primeros días de tratamiento al fluidificarse las secreciones, podrá observar un aumento de mocos y flemas, que irá disminuyendo a lo largo del tratamiento.

No tome PULMONIX FORTE:

- Si es alérgico a la bromhexina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- No utilizar en niños menores de 2 años.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar PULMONIX FORTE. Se han recibido notificaciones de reacciones cutáneas graves asociadas a la administración de bromhexina hidrocloreto. Si le aparece una erupción en la piel (incluidas lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales), deje de usar PULMONIX FORTE y consulte a su médico inmediatamente.

Debe consultar al médico antes de tomar este medicamento si tiene:

- Enfermedad grave de hígado.
- Enfermedad grave de riñón.
- Si es usted asmático o tiene antecedentes de asma, padece alguna enfermedad respiratoria grave o tiene alguna dificultad para toser.
- Si padece enfermedades que predispongan a sufrir hemorragia digestiva, como úlcera de estómago o duodeno.

Niños y adolescentes

No administre este medicamento a niños **menores de 12 años** sin consultar al médico. Los niños **menores de 2 años** no pueden tomar este medicamento, está contraindicado en ellos.

Otros medicamentos y PULMONIX FORTE

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. No administrar conjuntamente con medicamentos antitusivos (para la tos) o con aquellos que disminuyen las secreciones bronquiales, ya que se puede provocar un acúmulo del moco fluidificado. No se han notificado interacciones negativas con antibióticos.

Toma de Pulmonix Forte con alimentos y bebidas

La toma de este medicamento con alimentos y bebidas no afecta a la eficacia del tratamiento.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se han realizado estudios de los efectos de PULMONIX FORTE sobre la fertilidad humana.

Este medicamento no se debe utilizar durante el embarazo o la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

Durante el tratamiento con este medicamento, en algunas ocasiones se pueden producir mareos, por lo que si se marea no conduzca ni maneje máquinas.

3. Cómo tomar PULMONIX FORTE

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos y niños mayores de 12 años: administrar 10 ml (16 mg) por toma, 3 veces al día. No superar la dosis de 30 ml al día (48 mg).

Uso en niños y adolescentes: los niños de edades comprendidas entre 2 y 12 años

no pueden tomar este medicamento sin consultar al médico.

Cómo tomar:

Este medicamento se toma por vía oral

Medir la dosis con el vasito dosificador que se incluye.

Se recomienda beber un vaso de agua o cualquier otro líquido después de cada dosis, y abundante cantidad de líquido durante el día.

-Si los síntomas persisten después de 5 días de tratamiento, o se produce: fiebre, erupciones en la piel, dolor de cabeza persistente o dolor de garganta, debe consultar al médico.

Si toma más PULMONIX FORTE del que debe:

Si ha tomado más PULMONIX FORTE del que debe, se pueden intensificar los efectos adversos sobre todo los de tipo estómago e intestino. Consulte inmediatamente al médico o al farmacéutico, o bien llame al Centro de Toxicología, indicando el medicamento y la cantidad ingerida:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Niños Sol María Ludovica (La Plata): (0221) 451-5555

Si olvidó tomar PULMONIX FORTE:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, PULMONIX FORTE puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): Vómitos, diarreas, náuseas, dolor en la parte superior del abdomen.

Efectos adversos raros (pueden afectar a 1 de cada 1.000 personas):

- Reacciones de hipersensibilidad.
- Broncoespasmo (cierre de conductos de aire en los pulmones).
- Exantema, urticaria.

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- Reacciones anafilácticas, tales como choque anafiláctico, angioedema (hinchazón de rápida progresión de la piel, de los tejidos subcutáneos, de las mucosas o de los tejidos submucosos) y prurito.
- Mareos y dolor de cabeza.
- Ardor de estómago.
- Aumento de los niveles de transaminasas (enzimas hepáticas).
- Reacciones adversas cutáneas graves (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrolisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda).
- Se ha informado sobre efectos secundarios gastrointestinales leves. En raros casos pueden presentarse reacciones alérgicas, incluyendo rash cutáneo, broncoespasmo, angioedema y anafilaxis.
- Trastornos del sistema inmunológico. Raros: reacciones de hipersensibilidad. Frecuencia no conocida: reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, angioedema y prurito.

• Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Raros: exantema, urticaria. Frecuencia no conocida: reacciones adversas cutáneas intensas (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda).

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la Página Web **www.biotenk.com.ar**, comunicándose al **0800-333-4404**, y/o comuníquese con el **ANMAT** mediante el **FORMULARIO DE NOTIFICACION ON LINE** disponible en **<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>** o **ANMAT Responde 0800-333-1234**.

5. Conservación y almacenamiento de PULMONIX FORTE

En su envase original a temperatura ambiente desde 15°C a 25°C.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento después de 12 meses de abrir el envase por primera vez.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de PULMONIX FORTE

Cada ml de jarabe contiene como principio activo Bromhexina clorhidrato 1,6 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Acido tartárico, Hidroxietilcelulosa, Sorbitol al 70%, Glicerina, Metabisulfito de Sodio, Mentol, Esencia de Cereza, Esencia de Cacao, Alcohol Etilico 96°, Agua purificada c.s.p 100 ml.

Aspecto del producto y contenido del envase

PULMONIX FORTE es un jarabe, de olor frutado. Se presenta en frasco PET de color ámbar que contiene 120 ml de jarabe e incluye vaso dosificador.

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL PACIENTE

Algunos resfriados y gripes pueden acompañarse de acumulación de moco en las vías respiratorias. En ocasiones, este moco se hace espeso y se adhiere a las paredes de dichas vías.

Esto explica que en estos procesos se produzca tos como un mecanismo de defensa del propio organismo ante la aparición de mucosidad, para expulsar las flemas y despejar las vías respiratorias.

La Bromhexina fluidifica el moco adherido, despegándolo. Al finalizar el resfriado o la gripe, se produce una disminución de la mucosidad y, por lo tanto, de la tos necesaria para eliminarla.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.



Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 54.050
Biotenk S.A. Zuviria 5747 C.A.B.A.
Elaborado en: Cañada de Gómez 4060/66/70/74/76 C.A.B.A.
Dirección Técnica: Balanian, Silvia - Farmacéutica.
Fecha de última revisión: 05/2026